



電腦断层掃描檢查須知

檢查前準備

- ❖ 請携同旧片及报告以作参考。
- ❖ 为避免延迟报告结果，请尽可能于检查当日带备尿液或大便样本到本中心。
- ❖ 除本须知所列之检查，如须接受其他检查，可致电本中心查询其他检查细节。

所有造影检查

- ❖ 如确定或怀疑怀孕，请通知本中心职员。
- ❖ 请携同旧片及报告以作参考。
- ❖ 除以上须知，如须接受其他检查，可致电本中心查询其他检查细节。

電腦断层掃描

- ❖ 電腦断层 (显影) 扫描
 - 接受注射显影剂扫描前四小时不可以进食，可饮适量清水。
 - 患有过敏、哮喘或心脏病之顾客，请提早一天到本中心领取抗敏感药。
 - 如正服用糖尿药甲福明 (Metformin) 或同类药物，必须于检查当日及注射后四十八小时内暂停服药。
- ❖ 上腹部及下腹部
 - 请于检查前一小时每隔十分钟饮一杯清水。
 - 如需要接受静脉造影注射，请参阅“电脑断层 (显影) 扫描”。
- ❖ 冠状动脉造影
 - 照常服用所有医生处方的药物 (糖尿药除外)。
 - 请参阅“电脑断层 (显影) 扫描”。