



## 電腦斷層掃描檢查須知

### 檢查前準備

- ❖ 請攜同舊片及報告以作參考。
- ❖ 為避免延遲報告結果，請盡可能於檢查當日帶備尿液或大便樣本到本中心。
- ❖ 除本須知所列之檢查，如須接受其他檢查，可致電本中心查詢其他檢查細節。

### 所有造影檢查

- ❖ 如確定或懷疑懷孕，請通知本中心職員。
- ❖ 請攜同舊片及報告以作參考。
- ❖ 除以上須知，如須接受其他檢查，可致電本中心查詢其他檢查細節。

### 電腦斷層掃描

- ❖ 電腦斷層（顯影）掃描
  - 接受注射顯影劑掃描前四小時不可以進食，可飲適量清水。
  - 患有過敏、哮喘或心臟病之顧客，請提早一天到本中心領取抗敏感藥。
  - 如正服用糖尿藥甲福明 (Metformin) 或同類藥物，必須於檢查當日及注射後四十八小時內暫停服藥。
- ❖ 上腹部及下腹部
  - 請於檢查前一小時每隔十分鐘飲一杯清水。
  - 如需要接受靜脈造影注射，請參閱「電腦斷層（顯影）掃描」。
- ❖ 冠狀動脈造影
  - 照常服用所有醫生處方的藥物（糖尿藥除外）。
  - 請參閱「電腦斷層（顯影）掃描」。